

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Pomme de Terre

Bulletin Technique n°8 du 3 juin 2008 - 2 pages

Mildiou

Toutes les parcelles de pomme de terre sont levées et elles atteignent pour certaines d'entre elles 40cm.
Les conditions climatiques de la semaine dernière sont restées favorables au développement du mildiou et on a enregistré une nouvelle contamination supplémentaire par poste. Les postes en 3ème ou 4ème génration ont surement compté une génération de plus depuis 2 jours. On a donc une génération supplémentaire par rapport à l'an passé à la même date. Les potentiels de sporulation sont importants. Le premier cas de mildiou en parcelle est signalé en Picardie.

Toutes les **variétés sensible et intermédiaires** doivent être sous protection dans tous les secteurs. La protection doit démarrer pour les variétés tolérantes.

(rectificatif à l'avant dernier bulletin : INNOVATOR est sensible).

Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station météo SRPV – Fredon – données au 01/06/2008				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 25/05
77-Chevry Cossigny	5ème	01/06	06/06	25,5
77-Villeroy	5ème	01/06	06/06	33,5
78-Boissy Sans Avoir	4ème	26 au 30/05	02/06	50
78-Poissy	5ème	01/06	06/06	7,5
91-Abbeville la Rivière	6ème	31/05 et 01/06	06/06	59,5
95-Villiers le Sec	6ème	01/06	06/06	23,5
Situation au niveau du modèle GUNTZ-DIVOUX Station Météo France – données au 31/05/2008				
Postes	Génération en cours	Date de la dernière contamination	Date prévisionnelle de sortie de taches	Pluies (en mm) depuis le 25/05
91-Bretigny	4ème	26 au 28/05 et 30/05	02/06	29,2
91-Courdimanche	3ème	25 au 30/05	01/06	29,1
91-Villiers le Bâcle	4ème	du 25 au 30/05	01/06	52,2
78-Magnanville	3ème	25-27-28 et 30/05	01/06	62,4
95-Roissy	4ème	27-28 et 31/05	02/06	22,6
95-Cormeilles en Vexin	4ème	25/05 et du 27/05 au 30/05	02/06	44,5
95-Wy dit Joli Village	4ème	25-27-28 et 30/05	01/06	47,8

Les produits à base de contact élaborés ou diffusants présentent un intérêt pendant les période à risque de lessivage important.
Les produits à base de diffusant ou ascendant sont plus intéressant dans les phases actives de croissance de la plante.

En cas de retard ou lessivage dans la protection fongicide, intervenez avec un produit à base de cymoxanil afin de rattraper d'éventuelles contaminations récentes (1-2 jours).

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

**Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE**
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis
Directeur gérant : N. THERRE





Ne pas faire plus de deux traitements à base de phénylamines (EPOK - EPERON PEPITE - TRECATOL) pour limiter l'effet des résistances.

Ravageurs

Pucerons

Les populations de pucerons n'ont pas évolué avec 0 à 5% de folioles avec des pucerons (jusqu'à 20% pour une parcelle à Milly la forêt-91).

Aucune intervention ne se justifie.

Doryphores

Les premières larves de doryphores au stade L1-L2 ont été observées à Aufferville (77) sur 5% des pieds observés.

Il est trop tôt pour intervenir.

.

Lieu	% de folioles
77-Aufferville	3%
77-Chambry	10%
77-Iverny	0%
77-Jouy le Chatel	0%
77-Nangis	0%
77-Villenauxe la petite	5%
91-Milly la Forêt	25%